



Dickdarmspiegelung (Koloskopie) mit allfälliger Polypentfernung

Mittels Dickdarmspiegelung werden der Dickdarm und der letzte Teil des Dünndarmes untersucht.

Vor der Untersuchung

Bitte befolgen Sie die separate Anleitung zur Darmreinigung. Blutverdünnungsmittel inkl. Aspirin müssen nicht zwingend abgesetzt werden.

Haben Sie in den letzten 10 Tagen Medikamente eingenommen, welche?

Besteht eine vermehrte Neigung zu Blutungen?

Ja Nein

Auf welche Medikamente besteht eine Allergie oder Überempfindlichkeit?

Besteht eine Allergie auf Latex oder Heftpflaster?

Ja Nein

Wurden Sie wegen eines Herzklappenfehlers operiert?

Ja Nein

Tragen Sie einen Herzschrittmacher oder Defibrillator?

Ja Nein

Leiden Sie an: Diabetes Nierenerkrankung
 Lungenkrankheit Epilepsie

Bei Frauen: Besteht möglicherweise eine Schwangerschaft?

Ja Nein

Untersuchung

Ein kurz wirksames Beruhigungsmittel (Propofol) erlaubt die schmerzfreie Untersuchung. Aus diesem Grund legen wir am Arm eine dünne Venenkanüle. Durch den After wird ein flexibles Instrument, das Endoskop (= Koloskop), eingeführt. Über Bildschirm wird das Innere des Darmes untersucht. Es wird etwas Luft und Kohlenäure in den Darm eingeblasen. Kleine Gewebeproben (Biopsien) können entnommen werden. Polypen (gutartige Schleimhautgewächse) sollten nach Möglichkeit in der gleichen Sitzung entfernt werden, da diese über Jahre in einen bösartigen Krebs übergehen können (Polypektomie). Die Untersuchung erfolgt unter dauernder Kontrolle der Sauerstoffsättigung mittels eines Clips am Finger. Falls nötig wird Sauerstoff durch eine feine Nasensonde zugeführt. Die reine Untersuchung dauert 20-30 Minuten. Rechnen Sie inkl. Vorbereitung und anschliessendem Ausruhen mit einem Zeitbedarf von ca. 1.5 Stunden.

Mögliche Komplikationen

Die Untersuchung ist äusserst risikoarm. Wenn Polypen entfernt werden, kann es in seltenen Fällen zu Verletzungen des Darms (in <1%) oder zu Blutungen (in ca. 5%) kommen, die meist direkt gestillt werden können. In seltenen Fällen kann es zur Beeinträchtigung der Atem- und Herzfunktion kommen. Operationen und lebensbedrohliche Zustände als Folge einer Darmspiegelung sind absolute Ausnahmefälle. Nachblutungen innerhalb einer Woche nach der Untersuchung sind möglich.

Nach der Untersuchung

Lenken Sie bitte kein Fahrzeug und bedienen Sie keine Maschine während mindestens 4 Stunden nach der Untersuchung. Gleichtags dürfen Sie auch keine rechtsgültigen Unterschriften leisten. In den Stunden nach der Untersuchung kann durch die vermehrte Luft im Darm noch ein Druckgefühl im Bauch bestehen. Nimmt dieser Druck zu oder treten neue Bauchschmerzen auf, bluten Sie erheblich aus dem After oder tritt Fieber auf, informieren Sie uns oder Ihren Hausarzt unverzüglich oder suchen Sie die Notfallstation des nächsten Spitals auf.

Bei Unklarheiten beantworten wir gerne noch vor der Untersuchung Ihre Fragen. **Rechnungsstellung:** In der Regel rechnen wir direkt mit der Krankenkasse ab. Gewebeproben lassen wir meistens im Institut für Pathologie der Spital Thurgau AG untersuchen. Sie erhalten von dort gesondert eine Rechnung.

Ich habe von diesem Informationsblatt Kenntnis genommen und bin mit der Darmspiegelung inklusive Beruhigungsmittel und allfälliger Polypentfernung einverstanden.

Ort / Datum

Unterschrift Patient / Patient

Unterschrift Ärztin / Arzt